

PODROBNÉ INFORMACE K VYSAZOVÁNÍ LÉKŮ PŘED OPERACÍ (např. Face lift , liposukce, operace prsou)

Užíváte -li jakékoli léky pravidelně a dlouhodobě – informujte nás a vždy, pokud si nejste jisti, které léky ponechat a které brát i v den operace – pošlete nám včas dotaz (základní informace je v dalším textu, ale může se jednat i o celou řadu dalších přípravků)

O přerušení předepsané léčby z důvodu plastické operace se porad'te s lékařem.

Před operací delší jak 3 hodiny je vhodné vysadit 2 týdny dlouhodobě brané **hormonální léky** - HRT = hormonální substituční léčba v přechodu (Livial atd), u antikoncepce brané několik let má smysl - pokud je to možné - vysadit nejméně jeden celý cyklus (není-li pak jistota otěhotnění – je vhodný alespoň test z moči nebo odběr HCG) . Vysazením těchto léků snížíte riziko vzniku krevní sraženiny a vent. následné embolie plicní.

Jeden až dva týdny před zákrokem byste neměli užívat preparáty obsahující **kyselinu acetylsalicylovou** (Acylpyrin, Aspirin, Anopyrin, Godasal, Thomapyrin..), ibuprofen (Ibalgin, Brufen), naproxen (Nalgesin), vitamin E ve větších dávkách, enzymy (Wobenzym, Phlogenzym, koenzym Q – tyto je naopak velmi vhodné začít podávat od prvního dne po operaci) , dále speciální česnekové tablety, ginkgo biloba (extrakt z jinanu dvoulaločnatého – v lékárnách prodáváný jako Tanakan, Tebokan, Gingium, Ginkgo apod. ani žádné kombinované léky, které tyto látky obsahují. Tyto léky mají vliv na srážlivost krve a mohou vést ke zvýšenému krvácení při a po operaci – zvláště u face liftu.

Jako alternativu při bolestech možno zvolit například paracetamol (Paralen, Panadol), při větší bolesti tramadol (Tramal), apod.

Týden před plastickou chirurgickou operací neužívejte preparáty obsahující **kumariny** (Warfarin)-nutná kontrola Quick (INR) – max. hodnota do 1,5.

Neužívejte rovněž léky k oplasknutí nosní sliznice obsahující **Pseudoefedrin** (Coldrex, Nurofen atd. – čtete prosím příbalové letáčky).

Příklad některých léků, které mohou(zvláště v kombinaci) zvyšovat tendenci ke krvácení (Acifein, Acylcofin, Acylpyrin, Godasal, Aggrenox, Anopyrin, Aspirin, Aspro , Apo Ibuprofen,, Brufen, Ibalgin, Ibufein, Clarinase repetabs, Daleron proti chřipce, Disophrrol repetabs, Dolgit, Dynalgie, Modafen, Nurofen, Stopgrip, Upsarin a další).

Alespoň 48 hodin před výkonem (pokud to zdravotní stav dovoluje) – neužívejte prosím žádná **antidepresiva** (zvláště staršího typu jako např. Amitriptylin apod.) - ve spojení s celkovou anestézií se mohou projevit poruchy srdečního rytmu.

Dva dny před výkonem také neužívejte léky na odvodnění (**diuretika**).

NAOPAK - NEVYSAZUJEME

- léky na vysoký **tlak** (bereme i v den operace – brzy ráno)
- léky na poruchy srdečního rytmu , beta blokátory (**antiarytmika**)
- léky **na štítnou žlázu** (zvýšená i snížená funkce štítnice může mít za následek jiný průběh celkové anestezie, proto dobře zavedenou léčbu nevysazujeme).