

Žádanka o předoperační vyšetření

Příjmení:	Jméno:
Rodné číslo:	Zdravotní pojišťovna:
Bydliště:	
Dg. a doporučený operační výkon:	
Nástup dne:	
Datum:	Razítko a podpis operátora:

Vyplní praktický lékař nebo internista (platnost 1 měsíc, u dětí 2 týdny)

Váha:	Výška:	TK, P:
Alergie:		
EKG (nad 40 let, platnost 1 měsíc):		
RTG srdce a plic: (nad 60 let, po ak. resp. nemoc., cizinci, platnost 12 měsíců):		
Anamnesa:(RA, OA, AA, FA)		
Obj.nález:		
Dg. závěr:		
Datum:	Razítko a podpis:	
<p>Minimální rozsah přiloženého laboratorního vyšetření u ASA I : KO + trombo, Quick, aPTT, CRP, moč a sediment. (u zdravých pac.platnost až 1 měsíc, u dětí 2 týdny)</p> <p>u ASA II navíc EKG, minerály, urea, kreatinin, glykémie, ALT, AST, celkový bilirubin, ev. další cílené vyš (TSH) (viz.příloha) (platnost 1 - 2 týdny)</p>		

Standardy MZd - výpis

Platnost předoperačních vyšetření : Platnost

Interní vyš. ASA 1 – rodinný lékař, nebo přímo anesteziolog.....	4 týdny
ASA 2 – internista.....	2 týdny
ASA 3 a 4 – internista.....	1 týden

Specialistou – dle závažnosti a charakteru komplikujícího onemocnění

Platnost komplementárních vyšetření : Platnost

Biochemická a hematologická vyšetření – KO, tromo, Quick, aPTT, CRP, moč chem. u stabilizovaných pacientů.....	1 měsíc
u nestabilních pacientů – další cílená vyš. dle onemocnění.....	1 týden
EKG (nad 40)	
u stabilizovaných pacientů.....	1 měsíc
u nestabilních pacientů.....	2 dny
RTG S+P (nad 60)	
u stabilizovaných pacientů.....	1 rok
po akutním infektu respiračního ústrojí.....	čerstvé
ICHS, malignity	čerstvé

Spirometrie u laparoskopických výkonů s kapnoperitoneem:

u pacientů s ASA 1.....	není nutná
u pacientů s ASA 2 a více (u stabilizovaných pacientů).....	1 měsíc

Echokardiografie, ergometrie.....čerstvé

Odstup od operace po prodělaném infekčním onemocnění:

lehčího typu (katar HCD, virosa, nachlazení apod.).....	2 – 3 týdny
od posledních příznaků onemocnění	
těžšího typu (bronchopneumonie apod.).....	4 – 6 týdnů
od posledních příznaků onemocnění	

Vysazování léků před operací:

Acylpirin, Anopyrin (event. nahradit Ibustrinem).....	5 dnů
Warfarin (kontrola INR do 1,5) event. přejít na NM heparin.....	5 dnů
Hormonální antikoncepce (nutné 4x vyšší riziko TEN).....	1 měsíc
Betablokátory.....	nevysazovat
Kardiotonika (u CHRI kontrola hladiny digoxinu).....	nevysazovat
Antihypertenziva (u stabilizovaných pacientů).....	nevysazovat
Diuretika (kontrola minerálů).....	2 dny

Klasifikace ASA:

- ASA1: Pacient bez komplikujících chronických onemocnění do 50 let
- ASA2: Pacient se stabilizovaným a plně kompenzovaným chronickým onemocněním, které neomezuje aktivitu nemocného nebo pacienta nad 50 let
- ASA3: Pacient se systémovým onemocněním omezující aktivitu nemocného
- ASA4: Pacient se závažným, nedostatečně kompenzovaným či dekompenzovaným systémovým onemocněním, které pacienta ohrožuje na životě
- ASA5: Moribundní nemocný, u něhož je operace poslední možností záchrany života